

**İLAC HAZIRLARKEN LÜTFEN  
AŞAĞIDAKİ UYARILARA  
DİKKAT EDİNİZ !!!**



**BİRLİKTE KULLANILMAYACAK İLAÇLAR**

<b>LİDOKAİN</b>	<b>×</b>	<b>PROKAİN</b>	Anafilaktik tipte reaksiyonlar gelişebilir.
<b>CUMADİN</b>	<b>×</b>	<b>ASETİL SALİSİLİK ASİT (Ecoprin, Aspirin)</b>	Kanama riski artar.
<b>METİLPREDNİZALON</b>	<b>×</b>	<b>GREYFURT SUYU</b>	İlaçların kan konsantrasyonuna sebep olur.
<b>NSAİD (DiklofenakNa, Naproksin)</b>	<b>×</b>	<b>ALKOL</b>	GİS Kanama riski
<b>C VİTAMİNİ</b>	<b>×</b>	<b>SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ</b>	C vitaminin emilimini engellemesi
<b>KOLLESTROL İLAÇLARI</b>	<b>×</b>	<b>GREYFURT SUYU</b>	İçerdiği enzimler ile ilacın bağırsakta parçalanmasını geciktirmesi, kan konsantrasyonunda artış göstermesi

**HIÇBİR İLAÇLA  
KARIŞTIRILMAYACAKLAR**

**DİAZEPAM**

**FURAMİD**

**ETKİLEŞİMİ EN TEHLİKELİ 10 İLAÇ**

Warfarin + Nsai (Asetilsalisilik Asit, Parasetamol, Metamizol Sodyum)  
Warfarin + Sülfonamid  
Warfarin + Makrolid Antibiyotikler  
Warfarin + Kinolon Grubu Antibiyotikler  
Warfarin + Fenitoin  
Ace İnh. + Potasyum Preparatı  
ACE İnhibitörü + Spironolakton  
Digoksin + Amiodoron  
Digoksin + Verapamil  
Teofilin + Kinolon Antibiyotik

Hazırlayan  
Farmakovijilans Sorumlusu

Kontrol Eden  
KaliteYönetimTemsilcisi

Onaylayan  
Başhekim