



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Döküman Kodu : S.IY.LS.02
Yayın Tarihi : 19.02.2024
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1/1

BİRLİKTE KULLANILMAYACAK İLAÇLAR

İLAÇ HAZIRLARKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ UYARILARA DİKKAT EDİNİZ !!!

LİDOKAİN	X	PROKAİN	Anafilaktik tipte reaksiyonlar gelişebilir.
CUMADİN	X	ASETİL SALİSİLİK ASİT (Ecoprin, Aspirin)	Kanama riski artar.
METİLPREDNİZALON	X	GREYFURT SUYU	İlaçların kan konsantrasyonuna sebep olur.
NSAİD (DiklofenakNa, Naproksin)	X	ALKOL	GİS Kanama riski
C VİTAMİNİ	X	SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ	C vitaminin emilimini engellemesi
KOLLESTROL İLAÇLARI	X	GREYFURT SUYU	İçerdiği enzimler ile ilacın bağırsakta parçalanmasını geciktirmesi, kan konsantrasyonunda artış göstermesi

HİÇBİR İLAÇLA KARIŞTIRILMAYACAKLAR

**DİAZEPAM
FURAMİD**

ETKİLEŞİMİ EN TEHLİKELİ 10 İLAÇ

Warfarin + Nsai (Asetilsalisilik Asit, Parasetamol, Metamizol Sodyum)
Warfarin + Sülfonamid
Warfarin + Makrolid
Antibiyotikler Warfarin + Kinolon Grubu Antibiy.Ler)
Warfarin + Fenitoin
Ace İnh. + Potasyum Preparatı
ACE İnhibitörü + Spironolakton
Digoksin + Amiodoron
Digoksin + Verapamil
Teofilin + Kinolon Antibiyotik

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

DEKAN