



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Döküman Kodu : S.IY.LS.01
Yayın Tarihi : 19.02.2024
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1/1

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMİ LİSTESİ

Kullanılan ilaç	Etkileşimi olan besinler	Etkileşim sonuçları
Metilprednizolon	Greyfurt suyu	İlacın kan konsantrasyonunun artmasına sebep olur.
Antihistaminikler (difenhidramin)	Alkol	MSS üstündeki etkilerini artırır.
Benzodiazepinler (diezapan)	Alkol	MSS de hipnotik ve sedatif etkilerini artırır.
Ranitidin (histamin H2 reseptör antagonistleri)	Alkol	Midedeki ADH baskılayan ilaçlar kandaki alkol düzeyinin beklenenden daha fazla olmasına yol açar.
NSAİD (diklifenak, ketoprofen, naproksin)	Alkol	GİS kanama riskini artırır.
Opioid (fentalin, morfin)	Alkol	MSS etkilerini artırır.
Teofilin	Kafein	Konvülsiyon, tremor, uykusuzluk, bulantı, kalp çarpıntısı gibi yan etkileri ortaya çıkar.
Ranitidin	Kafein	Kafein etkisini artırır
Furosemid	Potasyum ve sodyumca zengin besinler	Aşırı sodyum alımı, su ve potasyum kaybına ve elektrolit bozukluğuna neden olur.
Teofilin	Aşırı yağlı besinler	Emilimi artır, kan teofilin düzeyindeki artışa sebep olur, baş ağrısı, kusma, bulantı yapar.
Teofilin	Proteince zengin besinler	Teofilin metabolizması artar, kan düzeyi düşer.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

DEKAN