DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ		
KRON – KÖPRÜ SÖKÜMÜ, GEÇİCİ KRON, GECE PLAĞI, TAMİR, BESLEME AYDINLATMA VE ONAM(RIZA) FORMU	**Doküman No**	HSÇ.FR.10
	Yayın Tarihi	22.05.2025
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi	00
	Sayfa No	Sayfa 1 / 2

HASTANIN

DOSYA NUMARASI

ADI - SOYADI

*(*Hasta barkodunu varsa yapıştırınız.*)*

TEŞHİS:

TEDAVİ UYGULANACAK DİŞ

			55	54	53	52	51	61	62	63	64	65			
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
			85	84	83	82	81	71	72	73	74	75			

PLANLANAN TEDAVİ:

Bu onam formu size/hastanıza anlatılan ve uygulanacak olan tanı ve tedavi yöntemlerinin niteliği, işlem/lerden beklenen yararları, olası yan etkileri, alternatif tanı ve tedavi seçenekleri ve bunların özellikleri, bu işlem/ler gerçekleştirilmez ise hangi sonuçlara yol açabileceği gibi konularda sizi aydınlatmak ve rızanızı almak için hazırlanmıştır.

BİLMENİZ GEREKENLER İŞLEM

Kron Sökümü: Kron/köprü sökümü; alttaki destek dişlerin değerlendirilmesi, kanal tedavisi, çürük tespiti veya diş çekimi gibi işlemler için anestezili veya anestezi olmadan kron sökücü aletler ile yapılır. Kron/köprüler bu işlemle çıkmadıysa kron/köprünün kesilmesi gerekir ve protez tamamen kullanılmaz hale gelebilir. Bu işlem esnasında protezde çatlak, kırık oluşabilir, alttaki diş kırılabilir veya çekime gidebilir. Protezin tamiri veya yeniden yapılması gerekli ise tüm mali giderler hastaya aittir.

Geçici Kron: Kesilmiş dişlerin üzerine gerçek protezler yapılana kadar ölçü alınarak akrilik geçici kronlar hazırlanır. Geçici kronlar gerçek protezlerin renk ve şeklini birebir yansıtmayabilir. Geçici olarak yapıştırıldığı için zamanla düşebilir.

Tamir: Sabit ve hareketli protezlerde kırık veya çatlak olduğu zaman ağız içerisinde veya laboratuvarda teknisyen tarafından tamir yapılabilir. Tamir sonucunda renk farkı olabilir ve yeniden kırık veya çatlak oluşabilir.

Besleme: Zaman içinde tutuculuğunu kaybetmiş hareketli protezlerin içine besleme yapılabilir. Besleme sonucunda protezde tam bir tutuculuk sağlanamayabilir, vuruk olabilir, protezin ve dişlerin uyumu bozulabilir.

Gece Plağı: Diş sıkma, gıcırdatma, bruksizm veya cerrahi amaçla ağızdan ölçü alınarak alt veya üst çeneye laboratuvarda plak hazırlanır.

Doktor tarafından plağın ağza uyumlanabilmesi için ikinci bir randevu verilir.

İŞLEMİNİZİ KİM GERÇEKLEŞTİRECEK?

Bu işlem Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri, asistan ve uygulamada bulunan öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir.

İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR

Hekim tarafından yapılan işlemler çeşitli olup hepsi hastanın menfaatine yapılan uygulamalardır. Bazı durumlarda konsültasyona bağlı gerçekleştirilmesi uygun görülen tedavi seçenekleridir.

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR

Uygulunan bu tedavilerin doğru planlanması hastanın sadece protetik açıdan değil tüm ağız hijyenin sağlanabilmesi ve tedavilerinin yerine getirilmesi için yapılmaktadır. Bu işlemler yapılmadığı takdirde hastanın ağız ve diş sağlığı durumdan kötü etkilenecektir.

İŞLEMİN OLASI RİSK ve KOMPLİKASYONLARI

» Kron yada köprü sökümü işlemi esnasında protezler yüksek oaranda kırık ya da çatlak oluşma riski vardır. İşlem sonucu protezinizde oluşacak hasardan hekiminiz sorumlu değildir. Protezinizin tekrar yapılması gerekebilir.

» Kron yada köprü protezinin çıkarılması esnasında uygulanan kuvvete bağlı olarak dişlerde çatlaklar veya kırıklar gerçekleşebilir. Bu durumda dişe dolgu, kanal tedavisi ya da çekim uygulanabilir.

» Kron köprü sökümü esnasınada protezin altındaki dişler kendiliğinden tamamen çıkabilir. Bu durumda sabit veya hareketli protez yapılması gerekebilir.

» Geçici olarak yapılan dişler tam anlamıyla diş formunu yansıtmayabilir ve geçici simantasyonla uygulandığında düşebilir.

» Tamir ve besleme yapılması gereken protezler laboratuar esnasında başka hasarlar görebilir. Protezin dişlerle uyumu bozulabilir.

» Gece plağı yapımı esnasında plak oturmayabilir ve ölçünün yenilenmesi gerekebilir.

HASTANIN PROTEZ KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER

» Yeni yapılan geçici kronlar sağlamlık açısından daimi kron gibi olmadığı için mümkün olduğunca sert ve çıkarıcı gıdalardan uzak durulması gerekmektedir.

» Tamir ve besleme sonrası birkaç gün içerisinde diş ve diş dokularını acıtacak vuruklar oluşabilir. Bu durumdan kendiniz müdahale etmeden hekiminize başvurmanız gerekir.

» Gece plağı yapılan hastalarımızda 6 ay her gece takılması önerilmektedir. Uzun süreli takılmamaya bağlı olarak uyumu bozulabilir ve istenen etkiyi göstermeyebilir.

GEREKTİĞİNDE İŞLEM İLE İLGİLİ YARDIMA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Fakültemizi arayarak ilgili bölüme ulaşabilirsiniz.

ONAY

Ağzımın detaylı muayenesi yapıldı. Yapılabilecek protez türleri anlatıldı. Riskleri ve iyileşme süreci kullanımı hakkında bilgi veridi.

Teşhis ve tedavi esnasında ;

» Konsültasyon istenebileceği ve bunların tedavi sürecine katılabileceği,

» Öğrencilerin tanı ve tedaviye katılacağı, asistan ve öğretim üyeleri denetiminde çalışacakları,

» Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi hekimlerinin, öğrencilerin, dental teknisyen ve röntgen teknisyenlerinin röntgen çekebileceği

» Kimlik bilgilerimin gizli tutularak anamnez bilgilerimin, radyolojik görüntülerimin, fotoğraflarımın, tetkik sonuçlarımın (patoloji raporu, laboratuvar sonuçları vb) teşhis, bilimsel, eğitim veya araştırma amaçlı kullanılabileceği,

» Verilen randevulara aksatmadan gelinmesi ve hekimin tedavi ile ilgili öneri ve uygulamalarına uyulmasının tedavi sonuçlarını doğrudan etkileyebileceği,

Tarafıma açıklandı.

(LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BOŞLUĞA '**Bu Onam Formunu, Okudum ve Anladım**' YAZARAK İMZALAYINIZ)

……

HASTA / VELİ / VASİSİNİN		HEKİMİN	
ADI SOYADI	……	**ADI SOYADI**	……
TARİH	……/……/20……	**TARİH**	……/……/20……
YAKINLIK DERECESİ	……	**İMZA**	……
İMZA	……		