



AÇILMIŞ VE HAZIRLANMIŞ İLAÇLARIN SAKLAMA KOŞUL VE SÜRELERİ LİSTESİ

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | SİY.LS.04 |
| Yayın Tarihi | 17.04.2018 |
| Revizyon Tarihi | 00 |
| Revizyon No | -- |
| Sayfa No | 1 / 5 |

| İLAÇ ADI | ETKİN MADDE | SAKLAMA KOŞULLARI | AÇILDIKTAN VE/VEYA HAZIRLANDIKTAN SONRA STABİLİTESİNİ KORUDUĞU ZAMAN ARALIĞI |
|--|---------------------------------|---|--|
| ACTRAPID HM DERİ ALTI VE İ.V KULLANIM İÇİN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON 100 IU/ML, 10 ML | İnsan insülini 100 IU/ml | Buzdolabında (2-8°C) saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Işıktan korumak için flakon dış karton ambalajında saklanmalıdır. Çözelti berrak, renksiz ve sulu görünümde değilse bu tıbbi ürünü kullanmayınız. Donmuş Flakon kullanılmamalıdır. | Kullanılmaya başlandıktan sonra veya yedek olarak taşınırken 25°C'nin altında saklanmalıdır, Bu şekilde en fazla 6 hafta saklanabilir. Kullanılmaya başlandıktan sonra veya yedek olarak taşınırken buzdolabına konulmamalıdır veya dondurulmamalıdır. |
| BELOC İ.V ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 5 MG/5ML | Metoprolol tartarat 1mg/ml | 30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. | İnfüzyon çözeltisi ile seyreltikten sonra 12 saat içinde kullanılmalıdır. |
| BREVIBLOC PREMIKS İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 10 MG/ML | Esmolol hidroklorür 10 mg/ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ambalajında saklanmalıdır. Buzdolabında saklanmamalı ya da dondurulmamalıdır. | Mikrobiyolojik açıdan ürün torbası açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı durumlarda, kullanılmaya başlamadan önceki saklama süre ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır. Bu süre 2-8°C arasında torbanın kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda açılmadığı durumlarda normalde 24 saatten uzun olamaz. Açılan ürün 2-8°C arasında saklandığında 24 saat süreyle fizikokimyasal olarak stabildir. |
| BRIDION İ.V ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON 200 MG/2ML | Sugammadex s 200 mg | 30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan korunarak ve orijinal ambalajında saklanmalıdır. | Mikrobiyolojik açıdan, seyreltilen ürün hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmazsa, kullanımdan önceki kullanım sırasındaki saklama süreleri ve koşulları, seyreltme, kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadıysa genellikle 2 ile 8°C 'de 24 saatten fazla değildir. İlk kez açıldıktan ve seyreltikten sonra, 2-25°C'de 48 saat boyunca kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesi kanıtlanmıştır. |

Hazırlayan
Farmakovijilans Sorumlusu

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Başhekim



AÇILMIŞ VE HAZIRLANMIŞ İLAÇLARIN SAKLAMA KOŞUL VE SÜRELERİ LİSTESİ

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | SİY.LS.04 |
| Yayın Tarihi | 17.04.2018 |
| Revizyon Tarihi | 00 |
| Revizyon No | -- |
| Sayfa No | 2 / 5 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| BUDECORT STERİ-NEB NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON SÜSPANSİYONU İÇEREN TEK DOZLUK AMPUL 0.25 MG/ML | Budesonid 0.5 mg/2ml | Dik konumda ve ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Alüminyum folyo zarfları açıldıktan sonra, tek dozluk ampullerin kullanılmayan kısmı ışıktan korunması için zarfında muhafaza edilmelidir. | Koruyucu folyo zarfı açılmış ampuller 3 ay içerisinde kullanılmalıdır. Açılan ampullerin içeriği 12 saat içinde kullanılmalıdır. Sadece 1 ml kullanılması durumunda geri kalan içeriğin steril kalmayacağına lütfen dikkat ediniz. |
| CARDENOR İ.V İNfüZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 4 MG/4 ML | Norepinefrin 4 mg | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklanmalıdır. | Ampul açıldıktan sonra hemen seyreltilmelidir. İnfüzyon için seyreltilmiş çözeltileri ile 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında 24 saat stabildir. |
| CORASPİN ENTERİK KAPLI TABLET 100 MG | Asetilsalisilik asit 100 mg | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. <u>Nemden koruyunuz.</u> | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. <u>Nemden koruyunuz.</u> |
| DOPAMINE DBL İ.V İNfüZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 200MG/5ML | Dopamin hidroklorür 40 mg /ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak karton kutusunda saklanmalıdır. Çözeltinin rengi değişmişse kullanmayınız. | Mikrobiyolojik olarak ilaç <u>derhal kullanılmalıdır</u> . Derhal kullanılmazsa, kullanım sırasındaki saklama süresi ve şartları kullanıcının sorumluluğundadır ve normal olarak hazırlanan çözelti kontrol edilmedikçe ve aseptik şartlarda validasyonu yapılmadıkça, stabilite 2-8°C'de 24 saatten fazla değildir. kullanım sırasındaki kimyasal ve fiziksel stabilitesi 25°C'nin altındaki sıcaklıkta 48 saattir <u>Tek kullanım içindir.</u> |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Hazırlayan Farmakovijilans Sorumlusu | Kontrol Eden Kalite Yönetim Temsilcisi | Onaylayan Başhekim |
|---|---|-----------------------|



AÇILMIŞ VE HAZIRLANMIŞ İLAÇLARIN SAKLAMA KOŞUL VE SÜRELERİ LİSTESİ

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | SİY.LS.04 |
| Yayın Tarihi | 17.04.2018 |
| Revizyon Tarihi | 00 |
| Revizyon No | -- |
| Sayfa No | 3 / 5 |

| | | | |
|--|----------------------------|---|---|
| İESPOR İ.M/İ.V ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 250 MG | Sefazolin 250 mg | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. | Çözücüsü ile çözündürüldükten sonra oda sıcaklığında 24 saat, buzdolabında (2-8°C'de) 96 saat dayanıklıdır. |
| KAPRİL TABLET 25 MG | Kaptopril 25 mg | 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklanmalıdır. <u>Nemden koruyunuz.</u> | 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklanmalıdır. <u>Nemden koruyunuz.</u> |
| LİNCAİNE SPREY %10 50ML ŞİŞE | Lidokain 100 mg/ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız. <u>Dondurmayınız.</u> | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız. |
| MUSCURON ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON 50 MG/5 ML | Roküronyum bromür 10 mg/ml | Buzdolabında, 2-8°C arasında muhafaza edilmelidir. Buzdolabı dışında, 30°C altındaki oda sıcaklığında, maksimum 12 hafta muhafaza edilebilmektedir. Ürün bir kez çıkarıldıktan sonra tekrar buzdolabına konamaz. Saklama süresi raf ömrünü geçemez. | Herhangi bir koruyucu madde içermediğinden çözelti <u>flakon açıldıktan sonra hemen tüketilmelidir.</u> Mikrobiyolojik açıdan; seyreltilen ürün derhal kullanılmalıdır. Eğer derhal kullanılmazsa, kullanım içinde saklama zamanları ve koşulları kullanımdan önce kullanıcının sorumluluğundadır ve seyreltme kontrollü ve onaylanmış aseptik koşullarda gerçekleşmediyse, Buzdolabında 2-8°C'de 24 saatten fazla olamaz. İnfüzyon sıvıları ile seyreltmeden sonra; kimyasal ve fiziksel kullanım-içinde stabilitesi 30°C'de 72 saattir. |
| NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ ÇÖZELTİSİ | Sodyum klorür 0,9g/100 ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır. | Mikrobiyolojik açıdan, uygulamaya hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı durumlarda saklama koşulunun ve süresinin belirlenmesi ilaç eklenmesi/seyreltmesini yapanın sorumluluğundadır ve süre; bu işlemin valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı durumlarda buzdolabında 2-8°C arasında 24 saatten uzun değildir. <u>Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.</u> |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Hazırlayan Farmakovijilans Sorumlusu | Kontrol Eden Kalite Yönetim Temsilcisi | Onaylayan Başhekim |
|---|---|-----------------------|



AÇILMIŞ VE HAZIRLANMIŞ İLAÇLARIN SAKLAMA KOŞUL VE SÜRELERİ LİSTESİ

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | SİY.LS.04 |
| Yayın Tarihi | 17.04.2018 |
| Revizyon Tarihi | 00 |
| Revizyon No | -- |
| Sayfa No | 4 / 5 |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ ÇÖZELTİSİ | Dekstroz anhidrat 5g/100ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, saklanmalıdır. | Mikrobiyolojik açıdan, uygulamaya hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı durumlarda saklama koşulunun ve süresinin belirlenmesi ilaç eklenmesi yapanın sorumluluğundadır ve süre; bu işlemin valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı durumlarda normalde 2-8°C arasında 24 saatten uzun değildir. <u>Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.</u> |
| POVİSEPTİN ÇÖZELTİ %10 | Povidon iyot 10 g/100ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ağız sıkıca kapatılarak ve <u>ışık</u> <u>koruyarak</u> saklayınız. | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ağız sıkıca kapatılarak ve <u>ışık</u> <u>koruyarak</u> saklayınız. |
| PRECORT-LİYO İ.M/İ.V ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN AMPUL 40 MG | Metilprednis olon 40 mg | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıkta koruyarak saklayınız. Dondurmayınız. | Kendi çözücüsü ile karıştırdıktan sonra 48 saat içinde kullanılması gerekir. Oda sıcaklığında ve buzdolabında parenteral karışımın stabilitesi 48 saattir. |
| RAGASİT İ.M/İ.V İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 50 MG/2 ML | Ranitidin 50 mg/2ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıkta korunarak saklanmalıdır. | Kullanılmamış ilaç ve infüzyon sıvısı karışımları, oda sıcaklığında 24 saat içinde kullanılmalıdır. |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Hazırlayan Farmakovijilans Sorumlusu | Kontrol Eden Kalite Yönetim Temsilcisi | Onaylayan Başhekim |
|---|---|-----------------------|



AÇILMIŞ VE HAZIRLANMIŞ İLAÇLARIN SAKLAMA KOŞUL VE SÜRELERİ LİSTESİ

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | SİY.LS.04 |
| Yayın Tarihi | 17.04.2018 |
| Revizyon Tarihi | 00 |
| Revizyon No | -- |
| Sayfa No | 5 / 5 |

| | | | |
|--|------------------------|--|---|
| SETREX İ.V İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 3 MG/3ML | Granisetron 3mg/3ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ampulleri doğrudan gelen güneş ışığından koruyunuz. Dondurmayınız. | Sulandırıldıktan sonraki raf ömrü, 2°C-8°C'de buzdolabında saklamak koşulu ile 24 saattir. <u>24 saatten sonra kullanılmamalıdır.</u> İdeal olanı, i.v infüzyonunun uygulama anında hazırlanmasıdır. Hazırlandıktan sonra bekletilecekse, infüzyonlar uygun aseptik koşullarda hazırlanmalıdır. |
| SEVORANE LİKİD %100 ÇÖZELTİ 250 ML | Sevofluran 250 ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Dondurmayınız. Kapağı sıkıca kapalı tutunuz. Sevofluran, özel olarak sevofluran için kalibre edilmiş bir vaporizatörle, sevofluranın spesifik vaporizatörleri için dizayn edilmiş dolun sistemi veya diğer uygun sevoflurana spesifik vaporizatör dolun sistemleri kullanılarak uygulanmalıdır. | Geçerli olduğu takdirde kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" talimatına uygun olarak imha edilmelidir. |
| ZOLAMİD İ.V ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 15 MG/3 ML | Midazolam 15 mg/3ml | 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Dondurulmamalıdır. Oda sıcaklığında çalkalama ile çözünen bir çökeltme görülebilir. | Seyreltikten sonra 2-8°C'de buzdolabında 24 saat saklanabilir. |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Hazırlayan Farmakovijilans Sorumlusu | Kontrol Eden Kalite Yönetim Temsilcisi | Onaylayan Başhekim |
|---|---|-----------------------|